Praktische Tipps

Für die erste Zeit ist es von Vorteil blähendes Gemüse wie Kohl, Karfiol, Kraut, Zwiebel, Knoblauch, Paprika, usw. sowie blähendes Obst wie Zwetschken, Kirschen, Pfirsich, Nektarinen, etc. wegzulassen oder nur in kleinen Mengen zu essen. Ebenso werden fettreiche Zubereitungsarten wie Frittieren und scharfes Anbraten schlecht vertragen.

Wenn Sie eine längere Nahrungspause einhalten mussten, beginnen Sie mit mehreren kleinen Mahlzeiten über den Tag verteilt.

Obst und Gemüse werden besser vertragen, wenn Sie es überwiegend in gekochter oder gedünsteter Form genießen.

Brot ist besser verträglich, wenn es abgelegen ist (Hausbrot und Schwarzbrot vom Vortag).

Nach abgeklungener Entzündung ist eine schrittweise Umstellung auf eine ballaststoffreiche Ernährung empfohlen. Lebensmittel, die während der Entzündung gemieden wurden, können nun wieder gegessen werden. Trinken Sie weiterhin 1,5–2 Liter und vermeiden Sie Verstopfung.

Diese Broschüre dient als Orientierungshilfe und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, steht Ihnen das Team der Diätologen gerne zur Verfügung.

Chirurgische Abteilung

Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie

Leiter: Prim. Univ.-Prof. Dr. R. Függer

Tel.: +43-(0)732-7676-4702

Innere Medizin 4

Gastroenterologie und Hepatologie, Stoffwechsel- und Ernährungsmedizin, Endokrinologie

Leiter: Prim. Univ.-Prof. Dr. R. Schöfl

Tel.: +43-(0)732-7676-4441

Ernährungsmedizinischer Beratungsdienst

Tel.: +43-(0)732-7676-4460







Infos & Tipps

Divertikulitis

Ordensklinikum Linz Elisabethinen Fadingerstraße 1 | 4020 Linz

EIN UNTERNEHMEN DER VINZENZ GRUPPE UND DER ELISABETHINEN T +43-(0)732-7676-0

F +43-(0)732-7676-2106 F elisabethinen@

ordensklinikum.at W www.ordensklinikum.at





Wie reagiert Ihr Körper?

Plötzlich auftretender Schmerz über dem betroffenen Darmabschnitt oft mit Ausstrahlung in den Rücken. Daneben sind Fieber, Übelkeit, Erbrechen, eine Veränderung des Stuhlverhaltens von Durchfall bis Verstopfung die Symptome.

Begriffserklärung

Die Divertikulitis ist eine Erkrankung des Dickdarmes, bei der sich in Ausstülpungen der Schleimhaut (Divertikel) eine Entzündung bildet. Beachten Sie in den ersten 4-6 Wochen folgende Empfehlungen.

weniger verträglich

- faserreiches Gemüse/Obst wie Spargel,
 Sauerkraut, Rhabarber, Hülsenfrüchte wie Erbsen,
 Bohnen, Linsen
- blähende Lebensmittel wie Zwiebel, Lauch, Kohl, Birnen, frisches Brot
- Haut von Tomaten, Pfirsich, Weintrauben, Zwetschken, Zitrusfrüchten, ...
- Kerne von Gurken, Tomaten, Weintrauben, Kiwi, Ribisel, Himbeeren, Melone, Apfel, ...
- Vollkornbrot, Brot/Weckerl mit ganzen oder grob geschroteten Körnern und ganzen Gewürzkörnern wie Anis, Kümmel, Fenchel, ...
- Mohn, Nüsse in größerer Menge

gut verträglich

- faserarmes, kernloses Gemüse wie Zucchini, Kürbis, Rote Rüben, junger Kohlrabi, Karotten, ...
- faserarmes Obst wie Banane, Apfel, Birne, Melone, usw. verwenden; Schale und Kerne entfernen
- fein vermahlenes Korn z.B. Grahamweckerl
- mindestens 1,5–2 Liter täglich trinken
- langsam und in Ruhe essen -je besser die Nahrung gekaut und eingespeichelt wird, umso weniger belastet sie den Verdauungstrakt