Ordens
klinikum
Linz

Barmherzige
Schwestern
Elisabethinen

© istockphoto.com/Yuri_Arcus

EINLADUNG

Expert*innenabend
Hüftgelenkerhalt im Fokus

Montag, 15. Mai 2023 | Beginn: 17.30 Uhr

Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern,
Seilerstätte 4, 4010 Linz (Festsaal, 3. OG)

in Kooperation mit

OCM

Orthopädische
Chirurgie
München

Anmeldung unter: www.ordensklinikum.at/hueftchirurgie0523

FA Dr. Lukas Pichler
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

Wir erinnern uns gerne, wollen andere begeistern und Wissen teilen! Darum wird die Veranstaltung dokumentiert. Eine Teilnahme gilt für uns als Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern, Tonaufnahmen und Filmen für redaktionelle und werbliche Zwecke.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Orthopädie, Unfallchirurgie und Allgemeinmedizin!

Ich möchte Sie herzlich zu unserem ersten fachlichen Update mit dem Thema „**Gelenkerhaltende Hüftchirurgie**“ ins Ordensklinikum Linz einladen. Neben der steigenden Nachfrage für die Hüftarthroskopie, wo die Labrum und Knorpelchirurgie an Bedeutung gewonnen hat, möchten wir auch die therapeutischen Möglichkeiten der offenen gelenkerhaltenden Chirurgie, mit dem Fokus auf die Dysplasie, an der Hüfte mit Ihnen diskutieren und dazu die aktuellen wissenschaftlichen Daten präsentieren.

Neben der Evidenz wollen wir Ihnen natürlich auch die wichtigen Schritte zur richtigen Diagnose darstellen. Es freut mich besonders als weiteren Vortragenden Prof. Michael Dienst aus München ankündigen zu dürfen. Damit steht einem angeregten fachlichen Austausch nichts im Wege.

Somit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und freue mich auf Ihr Kommen.

FA Dr. Lukas Pichler
Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern

PROGRAMM

BEGINN: 17:30 Uhr

BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG

Dr. Lukas Pichler

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

17:35 - 17:55 KÖRPERLICHE UND RADIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER HÜFTE

FA Dr. Lukas Pichler

17:55 - 18:20 COXARTHROSE IM GRENZBEREICH

FA Dr. Lukas Pichler

18.20 - 18.40 HÜFTARTHROSKOPIE: WAS IST MÖGLICH?

FA Dr. Lukas Pichler

18.40 - 19.00 INDIKATION FÜR OFFENE HÜFTCHIRURGIE

Prof. Dr. Michael Dienst

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

(OCM München)

19.00 ABSCHLIEßENDE WORTE UND EINLADUNG ZUM BUFFET

Programmänderungen vorbehalten

Organisatorische Hinweise

VERANSTALTER:

Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern

FA Dr. Lukas Pichler

ZIELGRUPPEN:

Allgemeinmediziner*innen, Fachärzt*innen und Assistenzärzt*innen der Orthopädie und Unfallchirurgie

DFP-Punkte:

Für die Veranstaltung werden 2 Fortbildungspunkte bei der OÖ. Ärztekammer beantragt.

ANMELDUNG:

Wir bitten um Ihre verlässliche Anmeldung bis spätestens Freitag, 12. Mai 2023 unter www.ordensklinikum.at/hueftchirurgie0523

Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elena Madlschenter

Servicebereich Zuweiserbeziehungsmanagement & Marketing

Tel.: 0732/7677 - 6755 | E-Mail: veranstaltungen@ordensklinikum.at

Parken:

Wir empfehlen die nahegelegenen kostenpflichtigen Tiefgaragen in der Seilerstätte bzw. die Domgarage in der Stifterstraße.

Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartner*innen:

Hintergrundinformation: Gelenkerhalt geht vor Gelenkersatz

Seit Jahresbeginn bietet die Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern mit der Periacetabulären Beckenosteotomie (PAO) und der chirurgischen Hüftluxation auch Verfahren der offenen gelenkerhaltenden Chirurgie an.

Die endoprothetische Versorgung von Hüft- und Kniegelenken ist ein Schwerpunkt der Abteilung. Bereits seit über zehn Jahren wird auch die Hüftarthroskopie durchgeführt, mit Jahresbeginn wurde das Portfolio um die Labrumchirurgie und die Knorpeltherapie erweitert. Grundsätzlich besteht im Bereich der gelenkerhaltenden Hüftchirurgie hoher Bedarf, im Gegensatz zu Deutschland ist die Versorgungsdichte im öffentlichen Bereich mit Chirurg*innen, die häufig Hüftarthroskopien durchführen, aber eher gering.

Behandlung von Schäden der Gelenkklippe und Knorpelschäden

Im Rahmen einer Hüftarthroskopie wurden bislang Diagnosen wie das femoroacetabuläre Impingement (FAI) und die Epiphysiolyse behandelt. Künftig können im Ordensklinikum Linz auch Schäden an der Gelenkklippe behandelt werden. Aktuelle Studien zeigen, dass es für die Patient*innen langfristig Vorteile bringt, wenn die Gelenkklippe durch eine Refixation am Pfannenrand erhalten bleibt.

Knorpelschäden können ebenso minimalinvasiv arthroskopisch mit Spezialinstrumenten geglättet oder lose Knorpelaufbrüche arthroskopisch debridiert sowie instabile Knorpelanteile entfernt werden. Zum Standard gehört es, dass man unter Distraction, also unter Zug auf das Bein, das Gelenk, den Hüftkopf, aus der Pfanne distrahiert, den Hüftkopfknochen und den Gelenksknorpel in der Pfanne inspiziert und gegebenenfalls eine Knorpeltherapie durchführt.

Neu im Ordensklinikum Linz: Chirurgische Hüftluxation

Hüftexperte FA Dr. Lukas Pichler von der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern erläutert: „Mittels Arthroskopie sind nur 50 bis 70 Prozent eines Gelenks einsehbar, das heißt, jeder zirkuläre Defekt, zum Beispiel ein gutartiger Tumor, kann auf diese Weise chirurgisch nicht erreicht werden.“ Bei der chirurgischen Hüftluxation wird hingegen der Hüftkopf aus dem Gelenk herausluxiert, wodurch das gesamte Gelenk eingesehen werden kann. Eine chirurgische Hüftluxation kann bei zirkulären Deformitäten, bei denen das Labrum erneuert muss oder bei einer zirkulär auftretenden pigmentierten villonodulären Synovialitis (PVNS) sinnvoll sein. Auch eine ausgeprägte Osteochondrose, das sind ausgeprägte knorpelige, knöcherne Bildungen im Gelenk, kann arthroskopisch bei einem ausgeprägten Befund nur schlecht gelöst werden.

Die chirurgische Hüftluxation ist ein etabliertes Verfahren, dessen Ergebnis einer Arthroskopie gleichkommt – das zeigen Langzeit-Studiendaten der Berner Gruppe aus der Schweiz. Dr. Pichler erläutert: „Der Eingriff ist zwar invasiv und von der Wundfläche her die ersten Tage intensiver, aber auch die Hüftarthroskopie darf in der Nachbehandlung nicht unterschätzt werden. Bei beiden

Eingriffen muss man mit zwei bis drei Monaten Erholungsdauer rechnen. Die Patient*innen haben zwar keine großen Schmerzen, aber sie brauchen intensive Physiotherapie.“

Beckenumstellungs-Operation

Die Periacetabuläre Beckenosteotomie (PAO) ist eine Operation zur Korrektur der Hüftpfannenposition. Das Verfahren wurde Ende der 1980er Jahre von der Berner Gruppe entwickelt und wird weltweit durchgeführt. Die Langzeitdaten sind sehr gut. In Österreich ist die Hüftdysplasie aufgrund der Erfindung der Hüftsonografie durch Prof. Dr. Reinhard Graf an den Rand gerückt. Seit 1991 ist die Untersuchung der Hüfte bei Neugeborenen Standard, was eine frühzeitige Behandlung ermöglicht und dysplastische Hüften durch Nachreifung verhindert.

Mitunter bleiben trotzdem Dysplasien über, weil sie in der Sonografie nicht suffizient detektiert worden sind bzw. gibt es diese durch die Migration aus Ländern, in denen kein Hüftschall für Neugeborene vorgesehen ist. Die Zahlen bewegen sich im niedrigen einstelligen Bereich. Mädchen sind häufiger betroffen als Burschen. Meist um das 20.-25. Lebensjahr werden Hüftdysplasien bei langem Stehen oder bei Belastung schmerzhaft, weil der Hüftkopf durch die Minderüberdachung nach außen drängt, aus dem Gelenk zu subluxieren beginnt und eine Überbeanspruchung im äußeren Bereich der Überdachung vom Becken her zustande kommt. Dr. Pichler berichtet: „Im Moment bekommen 20-Jährige mit Schmerzen eine Physiotherapie zum Muskelaufbau. Die Betroffenen finden sich mit dem Schmerz ab, bis eine Hüftgelenksarthrose entsteht und sie schließlich eine Prothese erhalten. Diese Patient*innen profitieren von der PAO, weil sie danach eine remodelierte Beckensituation haben, wo die Kraftübertragung wieder normalisiert ist.“

Die im Ordensklinikum Linz angewandte OP-Technik bezieht sich auf Adoleszente und ist möglich, sobald die Wachstumsfuge geschlossen ist. Die Operation dauert circa zwei Stunden. Dr. Pichler erklärt: „Wir erzeugen am Becken künstlich eine Fraktur. Das Acetabulum wird dabei komplett freigelegt. Da das Becken sehr gut durchblutet ist, arbeiten wir mit einem ‚Cell-Saver-System‘, bei dem das eigene Blut wiederverwertet wird. Fremdbluttransfusionen werden dadurch vermieden.“ Unter kontrollierten Bedingungen können die Patient*innen die Hüfte von Anfang an belasten. Beim Heilungsprozess sind drei Monate einzurechnen.“

PAO versus Hüftprothese

Das Einsetzen einer Hüftprothese ist heute eine sehr gut funktionierende und mit einer Infektionsrate von zwei bis vier Prozent auch eine sehr sichere Operation. Allerdings ist die Prothese auch bei neuen hochwertigen Inlays durch die Reibung einer Abnutzung ausgesetzt, d. h. sie muss nach rund 20 Jahren getauscht werden. Bei jungen Menschen auch früher, weil sie etwa durch mehr Bewegung höhere Anforderungen an die Prothese haben. Dr. Pichler erläutert: „Bei der Prothese ist man irgendwann limitiert, denn es fehlt der Knochen und es besteht ein Infektionsrisiko, das bei jeder Reoperation höher wird. Im schlimmsten Fall muss das Gelenk ausgebaut werden.“ Aktuelle Publikationen weisen darauf hin, dass bei unter 50-jährigen aktiven Patient*innen eine Revisionsrate in den ersten 10 Jahren von bis zu 15 Prozent besteht. „Es sollte daher bei 20-Jährigen, die deutliche Schmerzen verspüren, das Ziel sein, das Gelenk so lange wie möglich zu erhalten“, betont Dr. Pichler

Diagnose Hüftdysplasie

Eine Hüftdysplasie erkennt man an Hüftzeichen, C-Zeichen, Schmerzen rund um Hüfte und Leiste, die in Richtung Gefäß ausstrahlen, bzw. von den Leisten her halbkreisförmige Schmerzen, die rund um die Hüften ausstrahlen. Die Diagnose wird über ein Beckenübersichtsröntgen erstellt, wo beide Seiten abgebildet sind, da nur so die Winkel bemessen werden können. Ein Hüft-röntgen reicht zur Diagnostik nicht aus.

Dr. Pichler appelliert an die Zuweiser*innen: „Wenn Sie junge Patient*innen mit Hüftschmerzen betreuen, die bereits eine Physiotherapie ohne Erfolg machen und es steht eine Dysplasie im Raum, überweisen Sie diese an unsere Orthopädie-Ambulanz.“

Kontaktdaten:

Spezialambulanz für Erkrankungen des Hüftgelenks
Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern

Telefonische Terminvereinbarung:

Mo – Fr, 12.00 – 15.00 Uhr unter Tel. 0732 7677 – 7252

www.ordensklinikum.at/orthopaedie